

Listado de aves del Parque Nacional El Palmar

Fuente: Archivo del Parque Nacional, actualizado por el Licenciado Germán MARATEO, y con las observaciones de campo del Guardaparque Julián ALONSO.

| UBICACIÓN TAXONÓMICA | |
|----------------------------------|--|
| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE VULGAR |
| ORDEN TINAMIFORMES | |
| FAMILIA TINAMIDAE | |
| Rhynchotus rufescens | Martineta Colorada |
| Nothura maculosa | Inambú común o Perdiz común |
| ORDEN RHEIFORMES | |
| FAMILIA RHEIDAE | |
| Rhea americana | Ñandú |
| ORDEN PODICIPEDIFORMES | |
| FAMILIA PODICIPEDIDAE | |
| Rollandia rolland | Macá común (antes, Podiceps rolland) |
| Podilymbus Podiceps | Macá de pico queso |
| Podiceps major | Huala o Macá Grande |
| ORDEN PELECANIFORMES | |
| FAMILIA PHALACROCORACIDAE | |
| Phalacrocorax brasilianus | Biguá (antes, Phalacrocorax olivaceus) |
| FAMILIA ANHINGIDAE | |
| Anhinga anhinga | Anhinga |
| ORDEN ANSERIFORMES | |
| FAMILIA ANHIMIDAE | |
| Chauna torquata | Chajá |
| FAMILIA ANATIDAE | |
| Coscoroba coscoroba | Coscoroba, Cisne Coscoroba, Cisne Blanco |
| Dendrocygna viduata | Pato Sirirí Pampa |
| Cairina moschata | Pato Criollo |
| Amazonetta brasiliensis | Pato Cutirí |
| Anas georgica | Pato Maicero |
| Anas flavirostris | Pato Barcino |
| Anas bahamensis | Pato Gargantilla |
| Anas versicolor | Pato Capuchino |
| Netta peposaca | Pato Picazo |
| ORDEN PHOENICOPTERIFORMES | |
| FAMILIA PHOENICOPTERIDAE | |
| Phoenicopus chilensis | Flamenco (muy raro, ocasional) |
| ORDEN ARDEIFORMES | |
| FAMILIA ARDEIDAE | |
| Syrigma sibilatrix | Chiflón |
| Egretta thula | Garcita blanca |
| Ardea cocoi | Garza mora |
| Casmerodius albus | Garza blanca (antes, Egretta alba) |
| Bubulcus ibis | Garcita bueyera |
| Butorides striatus | Garcita azulada |
| Nycticorax nycticorax | Garza bruja |
| Tigrisoma lineatum | Hocó colorado |
| FAMILIA THRESKIORNITHIDAE | |

| | |
|------------------------------|--|
| Phimosus infuscatus | Cuervillo de pico marfil |
| Plegadis chihi | Cuervillo de cañada |
| Ajaia ajaja | Espátula rosada (antes, Platalea ajaja) |
| FAMILIA CICONIIDAE | |
| Mycteria americana | Tuyuyú |
| Euxenura maguari | Cigüeña americana (antes, Ciconia americana) |
| ORDEN FALCONIFORMES | |
| FAMILIA CATHARTIDAE | |
| Coragyps atratus | Jote de cabeza negra |
| Cathartes aura | Jote de cabeza roja |
| Cathartes burrovianus | Jote de cabeza amarilla chico |
| Sarcoramphus papa | Jote real (alguna vez citada, requiere confirmación) |
| FAMILIA PANDIONIDAE | |
| Pandion haliaetus | Sangual |
| FAMILIA ACCIPITRIDAE | |
| Elanus leucurus | Milano blanco |
| Rhostrhamus sociabilis | Caracolero |
| Circus buffoni | Gavilán planeador |
| Accipiter erythronemius | Azor común o esparvero común (antes, Accipiter striatus) |
| Accipiter bicolor | Azor variado o esparvero variado |
| Geranospiza caerulescens | Gavilán de patas largas |
| Buteogallus urubutinga | Águila negra (muy raro) |
| Buteogallus meridionalis | Aguilucho colorado (antes, Heterospizias meridionalis) |
| Parabuteo unicinctus | Gavilán mixto |
| Geranoaetus melanoleucus | Aguila mora |
| Buteo magnirostris | Taguató común o Garganchillo |
| Buteo swainsoni | Aguilucho langostero |
| Buteo albicaudatus | Aguilucho de cabeza negra o de alas largas |
| FAMILIA FALCONIDAE | |
| Polyborus plancus | Carancho o Cara-cara |
| Milvago chimango | Chimango |
| Milvago chimachima | Chimachima |
| Falco sparverius | Halconcito Colorado |
| Falco femoralis | Halcón Plomizo |
| Falco peregrinus | Halcón Peregrino |
| ORDEN GALLIFORMES | |
| FAMILIA CRACIDAE | |
| Penelope obscura | Pava de monte común |
| ORDEN GRUIFORMES | |
| FAMILIA RALLIDAE | |
| Laterallus melanophaius | Burrito común |
| Porzana albicollis | Burrito grande |
| Aramides cajanea | Chiricote o Gallineta |
| Aramides ypecaha | Ypacaá o Gallineta |
| Pardirallus sanguinolentus | Gallineta común (antes, Rallus sanguinolentus) |
| Porphyryla martinica | Polla o pollona azul |
| Gallinula chloropus | Polla o pollona negra |
| Gallinula melanops | Polla o pollona pintada (antes, Porphyriops melanops) |
| Fulica leucoptera | Gallareta chica |
| FAMILIA ARAMIDAE | |
| Aramus guarauna | Carau |
| ORDEN CHARADRIIFORMES | |

| | |
|---------------------------------|--|
| FAMILIA JACANIDAE | |
| Jacana jacana | Jacana |
| FAMILIA SCOLOPACIDAE | |
| Gallinago paraguayae | Becasina común (antes, Gallinago gallinago) |
| Tringa melanoleuca | Pitotoi grande |
| Tringa flavipes | Pitotoi chico |
| Tringa solitaria | Pitotoi solitario |
| FAMILIA RECURVITROSTIDAE | |
| Himantopus melanurus | Tero real |
| FAMILIA CHARADRIIDAE | |
| Charadrius collaris | Chorlito de collar |
| Charadrius modestus | Chorlito de pecho canela |
| Vanellus chilensis | Tero común |
| Calidris alba | Playerito blanco |
| FAMILIA LARIDAE | |
| Larus dominicanus | Gaviota cocinera |
| Larus cirrocephalus | Gaviota de capucho gris |
| Phaetusa simplex | Atí |
| Sterna superciliaris | Gaviotín chico común |
| FAMILIA RYNCHOPIDAE | |
| Rynchops nigra | Rayador |
| ORDEN COLUMBIFORMES | |
| FAMILIA COLUMBIDAE | |
| Columba livia | Paloma casera EXÓTICO (Europa) |
| Columba picazuro | Picazuro |
| Columba maculosa | Paloma manchada |
| Zenaida auriculata | Torcaza |
| Columbina picui | Torcacita |
| Leptotila verreauxi | Yerutí común |
| ORDEN PSITTACIFORMES | |
| FAMILIA PSITTACIDAE | |
| Aratinga acuticaudata | Calancate común (raro) |
| Myiopsitta monachus | Cotorra común |
| Pionus maximiliani | Maitaka, loro Soey, o Choclero (muy raro) |
| ORDEN CUCULIFORMES | |
| FAMILIA COCCYZIDAE | |
| Coccyzus melacoryphus | Cuclillo de pico negro |
| Piaya cayana | Tingazú o Alma de gato |
| FAMILIA CROTOPHAGIDAE | |
| Crotophaga ani | Anó chico |
| Guira guira | Pirincho |
| FAMILIA NEOMORPHIDAE | |
| Tapera naevia | Crespín |
| ORDEN STRIGIFORMES | |
| FAMILIA TYTONIDAE | |
| Tyto alba | Lechuza de campanario |
| FAMILIA STRIGIDAE | |
| Otus choliba | Alicuco común |
| Bubo virginianus | Ñacurutú |
| Glaucidium brasilianum | Caburé chico |
| Speotyto cunicularia | Lechucita de las vizcacheras (antes, Athene cunicularia) |
| Asio flammeus | Lechuzón campestre, Lechuzón de campo |

| | |
|---------------------------------|---|
| | |
| ORDEN CAPRIMULGIFORMES | |
| FAMILIA NYCTIBIIDAE | |
| Nyctibius griseus | Urutaú |
| FAMILIA CAPRIMULGIDAE | |
| Podager nacunda | Ñacundá o Dormilón |
| Caprimulgus longirostris | Atajacaminos Ñañarca o Dormilón |
| Caprimulgus parvulus | Atajacaminos o Dormilón chico |
| Hydropsalis brasiliana | Atajacaminos o Dormilón tijereta |
| Eleothreptus anomalus | Atajacaminos o Dormilón de ala negra |
| Lurocalis natterei | Añapero Castaño |
| | |
| ORDEN TROCHILIFORMES | |
| FAMILIA TROCHILIDAE | |
| Anthracothorax nigricollis | Picaflor de vientre negro (raro-ocasional) |
| Lophornis chalybea | Coqueta verde (rarísimo) (dato no corroborable) |
| Chlorostilbon aureoventris | Picaflor común |
| Hylocharis chrysurá | Picaflor bronceado |
| Leucochloris albicollis | Picaflor de garganta blanca |
| Helimaster furcifer | Picaflor de barbijo |
| | |
| ORDEN CORACIIFORMES | |
| FAMILIA ALCEDINIDAE | |
| Ceryle torquata | Martín pescador grande |
| Chloroceryle amazona | Martín pescador mediano |
| Chloroceryle americana | Martín pescador chico |
| | |
| ORDEN PICIFORMES | |
| FAMILIA PICIDAE | |
| Picumnus cirratus | Carpinterito común |
| Melanerpes candidus | Carpintero blanco |
| Picooides mixtus | Carpintero bataraz |
| Veniliomis spilogaster | Carpintero barrado o carpintero oliva manchado |
| Colaptes melanolaimus | Carpintero real común |
| Colaptes campestris | Carpintero campestre |
| Campephilus leucopogon | Carpintero negro de lomo blanco |
| | |
| ORDEN PASSERIFORMES | |
| FAMILIA DENDROCOLAPTIDAE | |
| Drymornis bridgesii | Chincheró grande |
| Lepidocolaptes angustirostris | Chincheró chico |
| FAMILIA FURNARIIDAE | |
| Cinclodes fuscus | Remolinera común |
| Furnarius rufus | Hornero común o Caserito |
| Leptasthenura platensis | Coludito copetón |
| Schoeniophylax phryganophila | Chotoy |
| Synallaxis frontalis | Pijuí frente gris |
| Synallaxis albescens | Pijuí cola parda |
| Synallaxis spixi | Pijuí plumizo |
| Cranioleuca pyrrhophia | Curutié blanco |
| Asthenes baeri | Canastero chaqueño |
| Asthenes hudsoni | Espartllero pampeano |
| Phacellodomus striaticollis | Espinero de pecho manchado |
| Phleocryptes melanops | Junquero |
| Annumbicus annumbi | Leñatero |
| Pseudoseisura lophotes | Caserote castaño |

| | |
|--|--|
| <i>Syndactyla rufosuperciliata</i> | Titirí común |
| FAMILIA THAMNOPHILIDAE | |
| <i>Taraba major</i> | Chororó |
| <i>Thamnophilus ruficapillus</i> | Choca de corona roja |
| <i>Thamnophilus caerulescens</i> | Choca común |
| FAMILIA COTINGIDAE | |
| <i>Phytotoma rutila</i> | Cortarramas |
| FAMILIA TYRANNIDAE | |
| <i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> | Mosqueta de ojo dorado (antes, <i>Todirostrum margaritaceiventer</i>) |
| <i>Camptostoma obsoletum</i> | Piojito silbador |
| <i>Sublegatus modestus</i> | Suirirí copetón |
| <i>Suiriri suiriri</i> | Suirirí Común |
| <i>Elaenia spectabilis</i> | Fiofío grande |
| <i>Elaenia parvirostris</i> | Fiofío de pico corto |
| <i>Serpophaga nigricans</i> | Piojo gris |
| <i>Serpophaga subcristata</i> | Piojito común |
| <i>Serpophaga griceiceps</i> | Piojito trinador |
| <i>Stigmatura budytoides</i> | Calandrita (dato a confirmar) |
| <i>Culicivora caudacuta</i> | Tachurí coludo |
| <i>Polystictus perctoralis</i> | Tachurí canela |
| <i>Pseudocolopteryx flaviventris</i> | Doradito común |
| <i>Euscarthmus meloryphus</i> | Barullero |
| <i>Phylloscartes ventralis</i> | Mosquetita común |
| <i>Myiophobus fasciatus</i> | Mosqueta de pecho rayado |
| <i>Lathrotriccus euleri</i> | Mosqueta parda (antes, <i>Empidonax euleri</i>) |
| <i>Pyrocephalus rubinus</i> | Churrinche |
| <i>Xolmis cinerea</i> | Monjita gris |
| <i>Xolmis coronata</i> | Monjita coronada |
| <i>Xolmis irupero</i> | Monjita blanca |
| <i>Xolmis dominicana</i> | Monjita overa |
| <i>Lessonia rufa</i> | Sobrepuesto |
| <i>Knipolegus cyanirostris</i> | Viudita pico celeste |
| <i>Knipolegus lophotes</i> | Viudita copetona |
| <i>Hymenops perspicillata</i> | Pico de plata |
| <i>Fluvicola alviverter</i> | Viudita blanca (antes, <i>fluvicola pica</i>) |
| <i>Alectrurus risora</i> | Yetapá de collar |
| <i>Satrapa icterophrys</i> | Suirirí amarillo |
| <i>Machetornis rixosus</i> | Picabuey |
| <i>Myarchus swainsoni</i> | Burlisto de pico canela |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> | Suirirí real |
| <i>Tyrannus savana</i> | Tijereta |
| <i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i> | Tontilo gris |
| <i>Myiodynastes maculatus</i> | Benteveo rayado |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> | Benteveo común |
| <i>Xenopsaris albinucha</i> | Tijerilla |
| <i>Pachyramphus viridis</i> | Anambé verdoso |
| <i>Pachyramphus polychopterus</i> | Anambé negro |
| FAMILIA CORVIDAE | |
| <i>Cyanocorax chrysops</i> | Urraca común |
| FAMILIA VIREONIDAE | |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> | Juan Chiviro |
| <i>Vireo olivaceus</i> | Chiví común |
| FAMILIA TURDIDAE | |
| <i>Turdus amaurochalinus</i> | Zorzal mandioca o blanco, Chalchalero |
| <i>Turdus rufiventris</i> | Zorzal colorado |
| FAMILIA MIMIDAE | |

| | |
|------------------------------|--|
| Mimus saturninus | Calandria grande |
| Mimus triurus | Calandria real |
| FAMILIA TROGLODYTIDAE | |
| Cistothorus platensis | Ratona aperdizada |
| Troglodytes aedon | Ratona común |
| FAMILIA POLIOPTILIDAE | |
| Polioptila dumicola | Tacuarita azul |
| FAMILIA HIRUNDINIDAE | |
| Tachycineta leucorrohoa | Golondrina ceja blanca |
| Tachycineta leucopyga | Golondrina patagónica |
| Phaeoprogne tapera | Golondrina parda grande |
| Progne chalybea | Golondrina domestica |
| Notiochelidon cyanoleuca | Golondrina barranquera |
| Stelgidopteryx fucata | Golondrina de cabeza rojiza |
| Stelgidopteryx ruficollis | Golondrina de cuello canela o Ribereña |
| Riparia riparia | Golondrina parda chica o Zapadora |
| Hirundo rustica | Golondrina Tijerita |
| FAMILIA PASSERIDAE | |
| Passer domesticus | Gorrión EXÓTICO (Europa) |
| FAMILIA MOTACILLIDAE | |
| Anthus lutescens | Cachirla chica (antes, Anthus chii) |
| FAMILIA FRINGILLIDAE | |
| Carduelis magellanica | Cabecita negra común |
| FAMILIA PARULIDAE | |
| Parula pitaiyumi | Pitaiyumí |
| Geothlypis aequinoctialis | Arañero de cara negra |
| Basileuterus culicivorus | Arañero común |
| Basileuterus leucoblepharus | Arañero salvador |
| FAMILIA EMBERIZIDAE | |
| Zonotrichia capensis | Chingolo común |
| Ammodramus humeralis | Chingolo de ceja amarilla |
| Aimophila strigiceps | Chingolo de corona castaña o Cachilo de corona castaña |
| Gubernatrix cristata | Cardenal amarillo |
| Paroaria coronata | Cardenal común |
| Paroaria capitata | Cardenilla |
| Tachyphonus rufus | Frutero negro |
| Pipraeidea melanonota | Viuva |
| Piranga flava | Foguero |
| Thraupis sayaca | Celestino o Choguí |
| Thraupis bonariensis | Naranjero |
| Tangara preciosa | Saíra castaña |
| Stephanophorus diadematus | Frutero imperial |
| Saltatricula multicolor | Pepitero chico |
| Coryphospingus cucullatus | Brasita de fuego |
| Donacospiza albifrons | Pajerito canela o Cachilo canela |
| Poospiza nigrorufa | Sietevestidos |
| Poospiza lateralis | Monterita rojiza |
| Poospiza melanoleuca | Monterita de cabeza negra |
| Poospiza torquata | Monterita de collar |
| Sicalis flaveola | Jilguero dorado |
| Sicalis luteola | Misto |
| Emberizoides herbicola | Coludo grande |
| Embernagra platensis | Verdón o Verderón de las pajas |
| Volatinia jacarina | Volatinero |
| Sporophila caerulescens | Corbatita común |
| Sporophila hypoxantha | Capuchino canela (antes, Sporophila minuta) |

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Sporophila ruficollis</i> | Capuchino de garganta negra |
| <i>Sporophila cinnammomea</i> | Capuchino de corona gris |
| <i>Sporophila zelichi</i> | Capuchino de collar |
| <i>Saltator coerulescens</i> | Pepitero gris |
| <i>Saltator similis</i> | Pepitero verdoso |
| <i>Saltator aurantirostris</i> | Pepitero de collar |
| <i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i> | Reinamora chica |
| <i>Cyanocompsa brissonii</i> | Reinamora grande |
| FAMILIA ICTERIDAE | |
| <i>Cacicus chrysopterus</i> | Boyero de ala amarilla |
| <i>Cacicus solitarius</i> | Boyero negro |
| <i>Icterus cayanensis</i> | Boyerito |
| <i>Agelaius thilius</i> | Varillero de ala amarilla |
| <i>Agelaius ruficapillus</i> | Varillero congo |
| <i>Leistes superciliaris</i> | Pecho colorado (antes, <i>Sturnella superciliaris</i> o <i>Leistes militaris</i>) |
| <i>Pseudoleistes virescens</i> | Dragón o Pecho Amarillo común |
| <i>Amblyramphus holosericeus</i> | Federal |
| <i>Gnorimopsar chopi</i> | Chopí o Charrúa |
| <i>Molothrus bonariensis</i> | Tordo renegrado |
| <i>Molothrus rufoaxillaris</i> | Tordo de pico corto |
| <i>Molothrus badius</i> | Músico |